

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า ชาวบ้านมักเรียกว่า **“โรคกลัวน้ำ”** หรือ **“โรคหมาว้อ”** เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น สุนัข แมว ะบี สิง กระรอก ค้างคาว หนู แม่น้ำควาย แพะ ซึ่งโรคนี้หากเกิดอาการแล้วจะเสียชีวิตทุกราย



การติดต่อ

สัตว์ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจะแพร่เชื้อทางน้ำลาย คนหรือสัตว์จะติดเชื้อเมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัด ข่วน หรือน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคสัมผัสกับบาดแผล เชื้อบุตา จมูก ปาก

อาการในคน

จะแสดงอาการหลังรับเชื้อประมาณ 3 สัปดาห์ – 6 เดือน อาจนานถึง 1 ปี อาการเริ่มแรกคือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย คับรุนแรงบริเวณบาดแผล กระสับกระส่าย กลัวแสงกลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบาก ปวดท้องน้อย กล้ามเนื้อขากระตุก แขนขาอ่อนแรง หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาตและตายในที่สุด



อาการในสุนัข

ระยะฟักตัวของโรคจะอยู่ในช่วง 3 – 8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน โดยเมื่อสุนัขแสดงอาการแล้วจะตายภายใน 10 วัน อาการมี 3 ระยะคือ

ระยะแรก : มีนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม

ระยะตื่นเต้น : กระวนกระวาย ตื่นเต้น พุดพุด ไม่อยู่นิ่ง ม่านตาขยายกว้าง

ระยะอัมพาต : คอตก สันสีแดงคล้ายรอย น้ำลายไหล อ่อนแรง ทรงตัวไม่ได้ อัมพาตและตายในที่สุด



การป้องกัน

- ต้องนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
- ให้สุนัขอยู่ในสายจูงเมื่อพาออกนอกบ้าน ไม่ปล่อยไปเล่นพ่วนในสาธารณะ
- ทำหมันหรือฉีดยาคุมเพื่อควบคุมจำนวนไม่ให้มากเกินไป
- ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดด้วยคากา 5 ย.
- “อย่าเหยย อย่าเหยยบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง”
- เมื่อถูกสุนัขกัดต้องรีบล้างแผล ใส่ยา กักหมา (10 วัน) ทำหมัน ฉีดวัคซีนต่อจนครบชุด



เพียงเท่านี้ก็สามารถควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้แล้ว

“ร่วมมือกำจัดภัย ร่วมใจป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าจะสูญพันธุ์ ให้เล่ากันเป็นตำนาน”



เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

โทร 043 – 611 - 121